



TYLO-PHARMA

Registro SAGARPA: Q-9172-021

Antibiótico de amplio espectro.

Uso veterinario



FÓRMULA:

Cada 1000 g contiene:

Tilosina Fosfato 220 g

Excipiente c.b.p. 1000 g

Uso en: Cerdos y aves.

Descripción:

TYLO-PHARMA, premezcla formulada a base de Tilosina fosfato, antibiótico de amplio espectro y promotor del crecimiento, que actúa al interferir en la síntesis de la proteína bacteriana a nivel ribosómico, a través de la unión a la subunidad 50S. El efecto está limitado a las bacterias y micoplasmas en fase de división rápida, se metaboliza extensamente en el hígado antes de su excreción renal, bajo la forma de metabolitos inactivos, por vía oral alcanza su concentración efectiva en sangre a las 4 horas posteriores al consumo.

TYLO-PHARMA, posee amplia actividad antimicoplásmica para el control efectivo de las principales cepas de micoplasmas que afectan a las aves domésticas, y a los cerdos.

Indicaciones:

TYLO-PHARMA es una premezcla antibiótica con acción bactericida de amplio poder antimicoplásmico, indicada para el control Metafiláctico de la Enfermedad Respiratoria Crónica - ERC, y CRP

Vía de administración: Oral, mezclado en el alimento.

Polvo

Literatura exclusiva para el médico veterinario.



TYLO-PHARMA

Registro SAGARPA: Q-9172-021

Dosis:

AVES:

Pollos de engorda: Administrar de 3 a 5 kg de TYLO-PHARMA por tonelada de alimento, durante la 2ª, 4ª ó 5ª semana de edad para el control Metafiláctico de la ERC, (de 660 a 1,100 ppm).

Gallinas reproductoras y posturas comerciales:

Administrar de 3 a 5 kg de TYLO-PHARMA por tonelada de alimento, medicar en la 1ª, 6ª y 16ª semana de edad en la crianza y una semana al mes rompiendo postura hasta el pico de producción. (de 660 a 1,100 ppm).

CERDOS:

Preiniciador: Administrar 500 g de TYLO-PHARMA por tonelada de alimento (110 ppm deTilosina).

Desarrollo: Administrar 200g de TYLO-PHARMA por tonelada de alimento (44 ppm deTilosina).

Finalizador: Administrar 100g de TYLO-PHARMA por tonelada de alimento (22 ppm deTilosina).

Neumonía enzootica, en etapa de 0 a 45 kg de peso vivo:

Administrar de 500 g a 1 kg de TYLO-PHARMA por tonelada de alimento (110 a 220 ppm deTilosina).

Ileítis administrar en tres fases diferentes de control:

Dosis inicial: Administrar 500 g de TYLO-PHARMA por tonelada de alimento durante 4 semanas continuas (110 ppm deTilosina).

Dosis intermedia: Administrar 200 g de TYLO-PHARMA por tonelada de alimento durante 4 semanas continuas (44 ppm deTilosina).

Dosis final: Administrar 100 g de TYLO-PHARMA por tonelada de alimento, hasta 10 días antes del final de la engorda (22 ppm).

Advertencias:

- No utilizar este producto 5 días antes del sacrificio de los animales destinados para consumo humano.
- No consumir productos de origen animal, sino hasta después de 5 días del último tratamiento.
- Consérvese en lugares frescos y secos, no expuestos a la luz solar directa.
- Mantenga este producto fuera del alcance de los niños.
- Producto exclusivo para medicina veterinaria.

Consulte al Médico Veterinario.

Presentación: Saco de 25 Kg.

Hecho en México para:
Starpharma S. de R.L. de C.V.
Av. 8 de Julio
2166-2, Col. San Sebastianito
C.P. 45601
Tlaquepaque, Jal., México.
www.starpharma.com.mx
(33) 3797 7393

Polvo

Literatura exclusiva para el médico veterinario.